Рис. 2. Место кормления белобрюхих орланов ($6^{\circ}13'19.96''$ N, $99^{\circ}44'04.03''$ E) на о. Пулау Бесар Санга, о-ва Лангкави. Фото А. Халегизадэ.

Fig. 2. Feeding location of White-Bellied Sea Eagles ($6^{\circ}13'19.96''$ N, $99^{\circ}44'04.03''$ E), Pulau Sanga Besar, Langkawi Island. Photo by A. Khaleghizadeh.

Белобрюхий орлан. Фото О. Белялова.

White-Bellied Sea Eagle. Photo by O. Belyalov.

положено место кормления, где туристы кидают куски курицы, чтобы привлечь белобрюхих орланов, а также браминского коршуна (*Haliastur indus*) (рис. 2).

Khaleghizadeh A. & Anuar S. Factors affecting nest-site selection of the White-Bellied Sea Eagle *Haliaeetus leucogaster* (Gmelin, 1788) in coastal rainforests, Peninsular Malaysia. – Tropical Ecology. (in press).

The New Record of Breeding Pairs of the Booted Eagle in the National Park “Nizhnyaya Kama” in 2015, Republic of Tatarstan, Russia

НОВАЯ НАХОДКА ГНЕЗДЯЩЕЙСЯ ПАРЫ ОРЛОВ-КАРЛИКОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «НИЖНЯЯ КАМА» В 2015 ГОДУ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РОССИЯ

Bekmansurov R.H. (Elabuga Institute, Kazan Federal University; NP “Nizhnyaya Kama”, Elabuga, Republic of Tatarstan, Russia)

Бекмансуров Р.Х. (Елабужский институт Казанского федерального университета; Национальный парк «Нижняя Кама», Елабуга, Республика Татарстан, Россия)

DOI: 10.19074/1814-8654-2015-30-115-117

Контакт:

Ринур Бекмансуров,
Елабужский
институт Казанского
федерального
университета;
Национальный парк
«Нижняя Кама»,
423607, Россия,
Республика Татарстан,
Елабуга,
ул. Казанская, 89,
тел.: +7 85557 7 54 55
rinur@yandex.ru

Орёл-карлик (*Hieraaetus pennatus*) является слабо изученным видом на территории Республики Татарстан (РТ), как впрочем, и на большей части его гнездового ареала. Находки гнёзд орлов-карликов привносят новые представления о распространении вида. С 1960-х годов на востоке Европы наметилась тенденция к расширению ареала в северо-восточном направлении, в том

A new nest of the Booted Eagle (*Hieraaetus pennatus*) was found in the north-east of the Republic of Tatarstan on the May 7, 2015 during the examination of Nizh-

Орёл-карлик (*Hieraaetus pennatus*).
Фото Р. Бекмансурова.

Booted Eagle (*Hieraaetus pennatus*).
Photo by R. Bekmansurov.

Contact:

Rinur Bekmansurov,
Elabuga Institute, Kazan
Federal University;
National Park
"Nizhnyaya Kama"
Kazanskaya str., 89
Elabuga
Republic of Tatarstan
Russia, 423600
tel.: +7 85557 7 54 55
rinur@yandex.ru

числе распространение вида происходило и на территории Татарстана. Так, здесь до конца XX века орёл-карлик считался очень редким залётным видом. Но уже в конце 1990-х годов отмечены пары с брачным и гнездовым поведением в Верхнеуслонском, Камско-Устьинском и Лаишевском районах (Аськеев, Аськеев, 1999; 2006). В начале XXI века выявлены плотная гнездовая группировка не менее 10 пар в Тетюшском районе РТ (Корепов, 2006) вдоль р. Волга (Шучьи горы), 3 гнездовых участка в Бавлинском и Бугульминском районах (Карякин, 2006; 2007) и 2 гнездовых участка на правом берегу р. Кама в Мамадышском и Елабужском районах (Николенко, Бекмансуров, 2006). За последние 10 лет дополнительно отмечено гнездование в Верхнеуслонском (1 пара), Лаишевском (1 пара), Пестречинском (1 пара), Рыбно-Слободском (1 пара), Тукаевском (1 пара), Агрызском (1 пара) районах (О.В. Аськеев, личное сообщение; А.С. Аюпов, личное сообщение; данные автора). Разрозненные находки гнёзд этого вида в Татарстане, показывают, что орёл-карлик освоил значительную территорию республики. Вид занесён в Красную книгу РТ. Численность в Татарстане ещё в 2007 г. оценена не менее 77 гнездящихся пар (Карякин, 2007), при этом лишь на участке Шучьи Горы в Тетюшском районе численность оценивалась в 10–20 пар (Корепов, 2006). Скорее всего, современная численность вида в Татарстане приближается к 100 парам или даже выше.

В Татарстане орёл-карлик тяготеет преимущественно к достаточно крупным по площади лесным массивам вдоль крупных рек. Гнездится как в чистых широколиственных лесах, так и в смешанных лесах на месте боров и в борах. Не исключено появление гнёзд в небольших островных

nekamsk reservoir coast site in Borovet-sky forest of the Nizhnyaya Kama National Park. This woodland has the area of 93.44 km² and it borders the left coast of the reservoir. The nest is situated on the upper part of a pine on an offshoot at about 25 m above the ground and 5 m from the top of the pine. The nest is hidden in crown (fig. 1). The location of the pine is on the ledge of the coast slope. Under the nest runs a track used for hiking, skiing and bicycling. Recreation centers and summer camps are situated nearby (0.18 and 0.35 km respectively). Male and female are of different morphs: light and dark (fig. 2). The Booted Eagle's nest in given forest area was discovered for the first time. The closest nesting ground was known in 10.4 km on the left bank of Kama (Niznekamsk reservoir) in Bolshoy Bor forest with similar location.

Рис. 1. Гнездо орла-карлика (*Hieraetus pennatus*) в кроне сосны.
Фото Р. Бекмансунова.

Fig. 1. The nest of the Booted Eagle (*Hieraetus pennatus*) in the pine tree. Photo by R. Bekmansurov.

Рис. 2. Пара орлов-карликов: самец светлой морфы, самка – тёмной морфы. Фото Р. Бекмансунова.

Fig. 2. The breeding pair of the Booted Eagle: male – light morph, female – dark morph.
Photo by R. Bekmansurov.

лесах и колках. Гнёзда строит на расстоянии не более 300–500 м от опушки на деревьях, в основном на соснах (*Pinus sylvestris*), дубах (*Quercus* sp.), липах (*Tilia cordata*), тополях (*Populus nigra*), берёзах (*Betula* sp.), устраивая их в развилке ствола или в основании боковых ветвей. Большинство известных гнёзд ориентировано к реке с расположением на уступах террас и склонов. Возможно гнездование в поймах рек, как это известно, в Самарской области (Карякин, Николенко, 2008; Карякин, Паженков, 2008) и Башкирии (Карякин, 2006).

Новое гнездо обнаружено на северо-востоке Республики Татарстан 7 мая 2015 г. во время обследования участка побережья

Рис. 3. Обследованный участок Боровецкого леса с гнёздами орла-карлика (*Hieraetus pennatus*), чёрных коршунов (*Milvus migrans*) и ястреба-тетеревятника (*Accipiter gentilis*).

Fig. 3. The Borovetskiy forest where were found nests of the Booted Eagle (*Hieraetus pennatus*), Black Kite (*Milvus migrans*) and Goshawk (*Accipiter gentilis*).

краю. Кроме того, в 0,69 км расположено старое гнездо тетеревятника (*Accipiter gentilis*) (рис. 3).

Гнездо орла-карлика в данном лесном массиве обнаружено впервые. Ближайший гнездовой участок был известен в 10,4 км на правом берегу Камы (Нижнекамское водохранилище) в лесном массиве Большой Бор со сходным месторасположением. Но этот участок остался незанятым после гибели одного из партнёров.

Литература

Аськеев И.В., Аськеев О.В. Орнитофауна Республики Татарстан (конспект современного состояния). Казань, 1999. 123 с.

Аськеев И.В., Аськеев О.В. Орёл-карлик. – Красная книга Республики Татарстан. Казань, 2006. С. 78–79.

Карякин И.В. Новые данные о гнездовании орла-карлика на Бугульминско-Белебеевской возвышенности. – Труды Государственного природного биосферного заповедника «Керженский». 2006. Т. 3. С. 102–103.

Карякин И.В. Орёл-карлик в Поволжье, на Урале и в Сибири, Россия. – Пернатые хищники и их охрана. 2007. № 9. С. 27–62 [Karyakin I.V. The Booted Eagle in the Volga Region, Ural and Siberia, Russia. – *Raptors Conservation*. 2007. 9: 27–62].

Карякин И.В., Николенко Э.Г. Хищные птицы долины р. Самара. – Пернатые хищники и их охрана. 2008. № 12. С. 59–68 [Karyakin I.V., Nikolenko E.G. Birds of Prey in the Samara River Valley, Russia. – *Raptors Conservation*. 2008. 12: 59–68].

Карякин И.В., Паженков А.С. Хищные птицы Самарской области. Книга-фотоальбом. Самара, 2008. 66 с.

Корепов М.В. Новые данные о гнездовании орла-карлика и орлана-белохвоста в урочище «Шучьи горы», Россия. – Пернатые хищники и их охрана. 2006. № 7. С. 67–69 [Korepov M.V. New records of breeding the Booted Eagle and the White-Tailed Eagle in the natural boundary "Schuchy Gory", Russia. – *Raptors Conservation*. 2006. 7: 67–69].

Николенко Э.Г., Бекмансуров Р.Х. Новые находки орла-карлика на гнездовании в Татарстане. – Пернатые хищники и их охрана. 2006. № 6. С. 65–66 [Nikolenko E.G., Bekmansurov R.H. New records of breeding the Booted Eagle in the Republic of Tatarstan. – *Raptors Conservation*. 2006. 6: 65–66].

Нижнекамского водохранилища в Боровецком лесу национального парка «Нижняя Кама». Данный лесной массив площадью 93,44 км² примыкает к левому берегу водохранилища. Обследован участок площадью около 1,3 км². Гнездо расположено в верхней части сосны на боковой ветви на высоте около 25 м и 5 м от вершины. Гнездо скрыто в кроне (рис. 1). Месторасположение сосны – пологий береговой склон. Под гнездом проходит дорожка, используемая для пешеходных, велосипедных и лыжных прогулов. Поблизости расположены базы отдыха и детские оздоровительные лагеря (дистанции 0,18 и 0,35 км соответственно). Расстояние до берега 0,34 км, до асфальтированной дороги в лесу – 0,27 км. Птицы выдали себя характерным свистом. Самка покинула гнездо и вместе с самцом летали над гнездом. Самец и самка разной морфы: светлой и тёмной (рис. 2).

На обследованном участке дополнительно обнаружена колония чёрных коршунов (*Milvus migrans*) из 7 гнездовых участков с гнёздами на соснах и берёзах. Из них 6 определены как жилые и в них шло насиживание. Дистанция до ближайшего и дальнего жилых гнёзд коршунов – 0,2 и 1,3 км. Расположение гнезда орлов-карликов относительно колонии коршунов – с